D 34d 11/6

G. CERCOPTÈRE. Cercoptera. *Spinola.*

Antennes (glabres ?) (f. 2) (filiformes, beaucoup plus longues que le corps, distantes à leur origine, insérées sur le devant de la tête, en face et hors de l'échancrure interne des yeux, de onze articles. Le premier, épais, arqué, mais non renflé en massue, n'atteignant pas le bord postérieur de la tête. Le second, très petit, globuleux ; le troisième, deux fois plus long que le premier, plus mince, cylindrique ou très faiblement obconique ; les suivants, 4-10, semblables au troisième, diminuant insensiblement en diamètre et augmentant progressivement en longueur ; le onzième et dernier, deux fois plus long que l'avant-dernier. — *Tête* (f. 3) comme dans le genre Ibidion. Joues (f. 3 *a*) prolongées en dessous beaucoup plus bas que la bouche, verticales et terminées en pointe. — *Mandibules* (f. 3 *b*) courtes ; face externe bombée, extrémité bidentée. — *Palpes* égaux, filiformes : le dernier article tronqué, n'étant ni dilaté ni dolabriforme. — *Prothorax* comme dans le genre Ibidion, cylindrique, mutique, de la largeur de la tête, mais trois fois plus long, ayant deux sillons transversaux, l'un près du bord antérieur, l'autre près du bord postérieur. — *Écusson* extérieur nul. — *Élytres* (f. 4) un peu plus larges que le prothorax, près de la base, étroites, à côtés parallèles, déprimées et à dos plane, ne commençant à se rétrécir qu'en face des derniers anneaux de l'abdomen, se prolongeant notablement en arrière, au delà de l'anus ; prolongements postérieurs, en forme de queues très étroites, fortement rebordés et terminés en pointe mousse. — *Pattes* (f. 5) proportionnellement plus courtes que dans le genre Ibidion. Fémurs n'étant pas renflés en massue. Les quatre postérieures n'ayant qu'une seule épine apicale, placée au bord interne

de l'extrémité tarsienne. Celles de la troisième paire, plus fortes que les autres.

Voyez, pour les autres détails, le genre Ibidion. C'est immédiatement à sa suite qu'il faudra placer notre nouveau genre, qui appartient à la sous-famille des Cérambycins, et diffère évidemment des Ibidions par le premier article des antennes, par le prolongement dentiforme des joues, par les palpes filiformes, par l'absence de l'écusson extérieur, par la queue des élytres, et par les fémurs non renflés en massue.

C. DE BANON. *C. Banonii.* Spinola. (Fig. 1.)

Longueur, 11 lignes; largeur, 1 2/3.

Tête fortement ponctuée : points gros, enfoncés, rapprochés et distincts. — *Prothorax* luisant, peu sensiblement ponctué, si ce n'est au devant du sillon postérieur, où la ponctuation est plus serrée et plus forte : dos convexe, profondément excavé vers les deux tiers de sa longueur, excavation en arc transversal, dont la convexité est tournée en arrière : ligne médiane un peu enfoncée. — *Élytres* ayant sept stries de gros points enfoncés : cloisons planes; intervalles des stries pareillement planes, inponctués de la base jusqu'au milieu du dos, ponctués au delà; points en une seule rangée longitudinale, semblables à ceux des stries principales. Le cinquième intervalle, à partir de la suture, en côte arrondie, effacée en avant à quelque distance de la base, et en arrière, en face du point où l'élytre commence à se rétrécir; suture plane d'abord, rebordée ensuite jusqu'à l'extrémité de la queue. — *Queue* concave, finement ponctuée; dessous du corps luisant.

Couleurs. Antennes, tête et corselet noirs; ventre rougeâtre; élytres mi-parties de fauve et de noir, moitié anté-

rieure fauve : une tache humérale, longue et étroite, noire et renfermant une autre tache de la même forme et de la couleur du fond ; moitié postérieure et queue noires ; pattes de la même couleur ; tibias testacés.

J'ignore la patrie de cet insecte singulier. Mon exemplaire provient de la collection de feu Banon, auquel je l'ai dédié. M. Cantener, qui me l'a fourni, n'a pu me donner aucun renseignement. L'abdomen était trop endommagé pour permettre d'y reconnaître le sexe. Cependant la longueur des antennes semble convenir au mâle. Les points enfoncés du corps ont dû être autrefois piligères ; mais les poils ont disparu ; il en a pu arriver autant aux antennes. J'ai dû dire qu'elles sont glabres actuellement ; il ne s'ensuit pas qu'elles l'aient toujours été.

SPINOLA.

Juin 1839.

N°3



Cercoptera *Banonii* *Spinola.*

Spinola del. *N. Rémond imp.* *Davesne sc.*